



719 North Cascade Ave.
Colorado Springs, CO 80903
(719)433-7224



2920 North Cascade Ave.
Colorado Springs, Co 80907
(719)636-1201



2920 North Cascade Ave.
Colorado Springs, Co 80907
(719) 362-2300

Gracias por elegir a los asociados de Gastroenterología de Peak para sus necesidades de atención médica. Por favor lea lo siguiente y la inicial junto a las instrucciones. Estas instrucciones son esenciales para asegurar que usted tiene un procedimiento exitoso y la recuperación. El no adherirse a estas instrucciones puede resultar en la cancelación de su procedimiento.

<u>Protocolo de insulina para procedimientos</u>	<u>Iniciales del paciente</u>
Si tiene una EGD: no tome insulina o medicamentos orales para diabéticos el día del procedimiento.	
Si se está haciendo una colonoscopia: Tome la mitad de la dosis de insulina basal el día antes del procedimiento. Por favor revise su azúcar en la sangre con más frecuencia el día del procedimiento. Tenga el zumo de manzana claro o el zumo de uva blanco claro en la mano para ayudar a alzar niveles del azúcar según lo necesitado.	
<u>Protocolo anticoagulante para procedimientos</u>	<u>Iniciales del paciente</u>
Por favor detenga todos los anticoagulantes antes del procedimiento. Si está utilizando el Lovenox puente, por favor, retenga todo Lovenox el día del procedimiento. Detenga los diluyentes de la sangre de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Coumadin/warfarina – 5 días antes del procedimiento • Plavix – 5 días antes del procedimiento • Eliquis – 2 días antes del procedimiento • Xarelto – 2 días antes del procedimiento • Brilinta – 5 días antes del procedimiento • Effient – 7 días antes del procedimiento • Ticlid – 10 – 14 días antes del procedimiento • Aggrenox – 5 días antes del procedimiento • Aspirina para bebés – no deje de 	
Es esencial que usted se asegure de que su médico de prescripción le haya autorizado a pausar estos medicamentos.	
<u>Protocolo narcótico para procedimientos</u>	<u>Iniciales del paciente</u>
Medicamentos crónicos y a corto plazo para el dolor/ansiedad: Por favor no detenga estos medicamentos. Por favor, no haga cambios repentinos en la forma de tomar estos medicamentos el día del procedimiento.	
<u>Medicación Protocolo para procedimientos</u>	<u>Iniciales del paciente</u>
Si está tomando fentermina, por favor suspenda este medicamento 7 Días antes del procedimiento.	
Tenga en cuenta que todos los demás medicamentos, incluyendo medicamentos para la presión arterial y medicamentos anticonvulsivos , son Permitted el día de su procedimiento con un pequeño sorbo de agua.	
Por favor no beba nada 4 horas antes del procedimiento	

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, por favor llámenos a 719.636.1201.

Firma del paciente: _____ Fecha: _____

Coloque la pegatina del paciente aquí