



Instructions for your procedimiento

Qué **Colonoscopia con Miralax**

Donde

Hospital Grandview vista del pico del púlpito 5623 719 – 272-3600	Memorial Hospital Central 1400 Boulder St 719 – 365 – 5543 Check-in en la entrada norte	Memorial Hospital norte 4050 N BRIARGATE Pkwy 719 – 364 – 1773
Hospital St. Francis 6001 E WOODMAN RN 719 – 776 – 8010 PRE-registro	Campus de salud adventista de Castle Rock 2350 Meadows Blvd Castle Rock, Co 720 – 455 – 0150	Hospital Penrose 2222 N Nevada 719 – 776 – 8010 Pre-registro y programar una pre-op

Cuándo: fecha: _____ check in tiempo: _____ procedimiento tiempo: _____

–

Con

Dr. Patel	Dr. Krishnan	Dr. Lee	Dr. Rose
Dr. Kowalczyk	Dr. Sidhu	Dr. Moore	Dr. Harmon



El no adherirse a las siguientes instrucciones puede resultar en la cancelación de su procedimiento.

** Instrucciones importantes **	Iniciales
1. Por favor use ropa holgada y cómoda. Traiga sus tarjetas del seguro, una identificación de la foto, y un co-pago si está necesitado.	
2. Parada todos los diluyentes de la sangre 5 días antes de su procedimiento. Por favor, consulte con su médico que prescribe.	
3. Diabéticos: el día de su procedimiento, por favor sostenga las medicaciones diabéticas orales y la insulina de acción corta hasta después del procedimiento. Por favor, consulte con su médico que prescribe.	
4. Continúe tomando sus medicamentos cardíacos, de presión arterial y convulsiones como normal, pero No dentro de las 4 horas del procedimiento.	
5. Que Debe ser acompañado por un adulto responsable para llevarte a casa. Los autobuses y los servicios de taxi no están accepted a menos que esté acompañado por un adulto.	
6. Si usted no puede mantener esta cita por cualquier razón usted debe llamar a la oficina al 719 – 636 – 1201. se requiere un aviso de 48 horas, o usted estará sujeto a una tarifa de \$250.	
7. Absolutamente nada para beber 4 horas antes del procedimiento.	
8. Si su procedimiento está programado después de 12:00 al mediodía, es posible que tenga Líquidos claros hasta 4 horas antes de su Check-in Tiempo. Es posible que tenga los siguientes líquidos si no rojo o púrpura : café/té (sin cremas o leche), Gatorade, frescos claros, y Kool-Aid. Nada de coca, Pepsi, ni sodas de color.	

* por favor sea informado *

Cada procedimiento incurrirá en tres de cuatro honorarios separados que usted recibirá una cuenta para:

- Honorario de la facilidad – facilidad donde se realiza el procedimiento.
- Honorarios de médicos – pico de Gastroenterología asociados, P.C.
- Honorario de anestesiista
- Honorario de la patología-del laboratorio exterior que realiza pruebas en cualquier biopsia tomada durante su procedimiento.

A menos que usted sea auto-pago, el seguro debe cubrir la mayoría de estos gastos.



Cómo un prepare para su colonoscopia

1. Dos o tres días antes de comenzar la preparación:

- Compra dos botellas de Miralax (sobre la sección del laxante del contador) en botellas de 238 o de 255 gramos.
- Compra bisacodilo 5mg tabletas – cualquier laxante de marca, no diluted de heces.
- Compra 2 64 oz de G2 Gatorade, Gatorade o Powerade (no rojo/azul/púrpura)
- Opcional – toallitas de bebé, depende, Desitin, o ungüento de A & D.
- Siga la dieta baja en residuos/baja en fibra. Consulte la guía adjunta.

2. El día anterior su procedimiento:

- Usted no puede comer nada el día anterior o el día de su procedimiento!
- ¡usted no puede beber nada rojo o púrpura!
- ¡usted no puede consumir leche/lácteos!
- ¡usted no puede consumir bebidas alcohólicas!
- ¡usted no puede consumir refrescos oscuros!
- Usted no puede consumir ningún líquido 4 horas antes de su procedimiento. Usted puede beber: agua, limón/limonada, Gatorade® Sprite®, 7 hasta®, Ginger Ale, café y té (sin la desnatadora, el azúcar y el dulcificante son aceptables), el caldo claro, el caldo, las paletas y Gelatina® que no son de color rojo o púrpura.
- Tomo dos tabletas de bisacodilo a las 2:00 pm. luego mezclar la mitad de la botella de Miralax con 64 oz de Gatorade o Powerade. Beba la solución at _____. Repita el proceso anterior con el resto del Miralax en _____ el día del procedimiento.

3. El día de su procedimiento:

líquida
líquidos
antes de
Detenga
horas

Consejos útiles

- TOALLITAS DE BEBÉ SON MÁS AMABLES QUE EL PAPEL HIGIÉNICO
- LA JALEA DEL PETRÓLEO CALMA ÁREAS DOLORIDAS
- ¡ SIGUE SONRIENDO! 😊

▪ Permanezca en la dieta clara; Usted puede tener claros hasta cuatro horas su procedimiento. todos los líquidos 4 antes de su procedimiento.